



RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA HIPERTERMIA MALIGNA

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS Y SIGNOS CLÍNICOS PARA ESTABLECER EL DIAGNÓSTICO?

- Taquicardia.
- Rigidez muscular generalizada.
- Hipercapnia.
- Taquipnea.
- Espasmo del masetero.
- Arritmias cardíacas (taquicardia ventricular, fibrilación ventricular).
- Acidosis respiratoria y metabólica.
- Aumento rápido de la temperatura o Fiebre.
- Presión arterial inestable/hipertensión.
- Cianosis/piel moteada.
- Mioglobinuria.
- Sangrado excesivo.



MANEJO DE

6 Aplicar el dantroleno así: Mezclar cada vial de 20 mg con 60 ml. de agua estéril para inyección. La dosis inicial de Dantroleno es de 2,5 mg/kg. Después de 15 minutos de haber administrado esta dosis inicial, la rigidez, la acidosis, la taquicardia y los otros síntomas deben desaparecer; si no desaparecen, se deben administrar dosis intravenosas adicionales de 2,5 mg/kg cada 15 minutos hasta completar 10 mg/kg o hasta que los síntomas desaparezcan.

9 Tratar la hipertermia. (Se recomienda el uso de agua con spray sobre la piel y evaporar con ventilador, uso de solución salina intravenosa fría, lavado de cavidades corporales abiertas, lavado gástrico con agua fría).

ADQUISICIÓN DEL KIT DE DANTROLENO

Fuente: Recomendaciones para el manejo de la Hipertermia Maligna en la red integrada de servicios de salud. VI - SDS

- ✓ Médico tratante en el proceso anestésico deberá activar el protocolo de atención y de adquisición del Dantroleno
- ✓ El equipo designado debe gestionar los recursos y personal necesario para la recolección y transporte del medicamento.
- ✓ La entrega del medicamento no debe pasar de 30 minutos en lo posible, desde la notificación del evento ya que el retraso en la administración incrementa la mortalidad en un 30%
- ✓ Para efectos de la facturación, reposición y control del kit de medicamento, se deberá adjuntar vía correo electrónico al referente encargado, la siguiente información: Formulario médica, soporte de la historia clínica donde se dé cuenta de la cantidad de viales administrados al paciente, documento de identidad de este y copia del control de factores ambientales en donde se almacena el medicamento durante su préstamo (custodia).

2 - 3 % De disminución

En las tasas de mortalidad que han disminuido de forma dramática debido a la preparación de los equipos en salas de cirugía y a la disponibilidad del Dantroleno que es el medicamento de elección para el tratamiento de la Hipertermia Maligna

IMPORTANTE:

Recuerda siempre que al momento de solicitar un KIT debes diligenciar el Formulario 342 de Enfermedades Huérfanas así el caso no resulte en Hipertermia secundaria a anestesia.

Descárgalo en www.cundinamarquesa.org/rutadantrolene

LISTADO DE PROFESIONALES RESPONSABLES DEL SUMINISTRO DE DANTROLENE:

EN CADA SISS

Subred Integrada de Servicios de Salud (SISS)

RESPONSABLES
Gestores del servicio farmacéutico designados para la operación de la ruta.

SISS Norte

Líder Servicio farmacéutico
313 232 81 33
farmacia@subrednorte.gov.co
departamentoqx@subrednorte.gov.co

SISS Sur

Líder Servicio farmacéutico
300 324 38 06
liderfarmacia@subredsuroccidente.gov.co

SISS Sur Occidente

Referente técnica servicios de anestesia
300 216 03 97
referenteanestesiologia@subredsuroccidente.gov.co

SISS Sur Oriente

Líder Servicio farmacéutico
315 609 98 31
referentefarmacaceutico@subredcentrooriente.gov.co

Recomendaciones para el manejo de la Hipertermia Maligna en la Red integrada de Servicios de salud en colaboración con:

EN LA RED PRIVADA

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD - IPS

RESPONSABLES DESIGNADOS POR LA IPS

Red de Farmacias Cruz Verde:

Líder Servicio farmacéutico
5946161 ext. 1041, 1044, 1047 / 318 38215 48
yeimy.cardenas@cruzverde.com.co

Hospital Universitario San Ignacio:

Líder Servicio farmacéutico
594 6161 Ext. 1043-1045
vapinzon@husi.org.co,
bodega_medicamentos@husi.org.co

Fundación Operación Sonrisa:

Líder de Programa
300 208 02 05
laura.vanderwerf@operacionsonrisa.org.co

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el tratamiento de elección para el abordaje del paciente con Hipertermia Maligna?

- Dantroleno Sódico

¿Cuántos viales componen el kit para el tratamiento de la fase aguda de la Hipertermia Maligna?

- 12 viales de Dantroleno Sódico

¿Requiere el paciente con Hipertermia Maligna administración de dosis adicionales de Dantroleno?

- Si, el paciente puede requerir dosis adicionales a las 6 y a las 24 horas posteriores a la presentación del evento de Hipertermia Maligna

¿Dispone la ciudad de Dantroleno Sódico?

- Si, la ciudad de Bogotá desde el año 2017 constituyó la red para el manejo de la Hipertermia Maligna, donde se dispone de Kits compuestos por 12 viales del medicamento en las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud, además de otras instituciones participantes de la red privada. (remitirse a tablas 1 y 2)